

**ผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ
(ปีที่ 1) ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน**

**Effect of Chemical Fertilizer Management in Combination with Boron on Growth
and Yield of First Ratoon Cane Planted in Kamphaeng Saen Soil Series**

**ยศวดี เม่งเอียด¹ ชัยสิทธิ์ ทองजू^{1*} ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย¹ จุฑามาศ ร่มแก้ว²
ธรรมธวัช แสงงาม³ และธีรยุทธ คล้าชื่น⁴**

Yodsavadee Mengead¹ Chaisit Thongjoo^{1*} Tawatchai Inboonchuay¹

Jutamas Romkaew² Thamthawat Saengngam³ and Teerayut Klumchaun⁴

ABSTRACT: This study investigated the effects of chemical fertilizer management in combination with boron on growth and yield of first ratoon cane var. LK 92-11 planted in Kamphaeng Saen soil series. Experimental design was arranged in Randomized Complete Block (RCBD) with three replications and consisting of nine treatments. The study revealed that the application of 110% of chemical fertilizer based on soil chemical analysis in combination with 156 g/rai of B gave the highest plant height, number of stalks for one-meter row, leaf greenness, fresh yields, weight/stalk, number of internode/stalk, CCS, sugar yields and concentrations of N, P, K in stalks. This was not different from the application of 110% of chemical fertilizer with 104 g/rai of B. Furthermore, the application of 110% of chemical fertilizer with 156 g/rai of B gave the highest concentration of B in the stalks, followed by that the application of chemical fertilizer based on soil chemical analysis in combination with 156 g/rai of B, the application of 110% of chemical fertilizer with 104 g/rai of B and the application of chemical fertilizer based on soil chemical analysis in combination with 104 g/rai of B, respectively.

Keywords: Fertilizer, Boron, Sugarcane

¹ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

² ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

³ สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

⁴ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

¹ Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, 73140.

² Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140.

³ Kanchanaburi Research Station, Research and Academic Service Center, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, 73140.

⁴ Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani 12130.

* Corresponding author: agrcht@ku.ac.th and thongjuu@yahoo.com

บทคัดย่อ: ศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับไบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) พันธุ์ LK 92-11 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 9 ตำรับทดลอง ผลการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ มีผลให้ความสูงของต้น จำนวนลำใน 1 แถวเมตร ค่าความเขียวของใบอ้อย ผลผลิตอ้อยสด น้ำหนักต่อลำ จำนวนปล้องต่อลำ ค่า CCS ผลผลิตน้ำตาล ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่สะสมในท่อนลำของอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ยังมีผลให้ความเข้มข้นของธาตุไบรอนที่สะสมในท่อนลำของอ้อยมากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_{100\%}} + B_{156}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_{110\%}} + B_{104}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_{100\%}} + B_{104}$) ตามลำดับ

คำสำคัญ: ปุ๋ย, ไบรอน, อ้อย

คำนำ

อ้อยเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่มีสำคัญและเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) รายงานว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 9.96 ล้านไร่ ได้ผลผลิตอ้อยสดประมาณ 109.86 ล้านตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 11.03 ตัน/ไร่ ซึ่งความต้องการอ้อยภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การผลิตอ้อยของประเทศที่ค่อนข้างจำกัดทั้งด้านพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตของอ้อย คือ การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้สูงขึ้น ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี เช่น การคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับแหล่งปลูก การเลือกฤดูกาลปลูก และการศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสม เป็นต้น ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญต่อการยกระดับผลผลิตของพืชผลทางการเกษตร (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ในแต่ละปีประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อใช้ในภาคการเกษตรสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการนำเข้าปุ๋ยเคมีปริมาณมากถึง 4.88 ล้าน

ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 49,301 ล้านบาท (ยุคละ, 2559) ด้วยมูลค่าของปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มต้นทุนการผลิต ดังนั้น การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยที่สอดคล้องกับราคาปุ๋ย แล้วปรับใช้ให้เหมาะสมกับค่าวิเคราะห์ดิน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตของเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันในระบบการค้าเสรีได้ การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดินจากค่าวิเคราะห์ดินเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ลักษณะของดินที่แตกต่างกันในแต่ละชุดดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกันตามการจัดการดิน หรือการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร สภาพภูมิอากาศ หรือการกระจายตัวของฝนที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละปี เป็นต้น (ระวีวรรณ และคณะ, 2552; ศิริสุดา และคณะ, 2552) ไบรอน เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของพืช หากขาดแคลนพืชก็ไม่อาจเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้

(Plaster, 1992; Miller and Donahue, 1995) ไบรอนมีส่วนสำคัญในการออกดอกและการผสมเกสร มีบทบาทในการติดผล และการเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล การเคลื่อนย้ายฮอร์โมน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจน และการแบ่งเซลล์ หากพืชขาดไบรอนจะส่งผลให้ตายอดตายและเริ่มมีตาข้าง ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบชิดกัน ใบเล็กหนา ค้างและเปราะ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การใช้ไบรอนเพื่อการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย จึงเกิดแนวคิดที่จะทำการศึกษาต่อเนื่องอีก 1 ปีในสภาพพื้นที่เดิมของปริญญาพันธุ์ (2561) เพื่อต้องการยืนยันผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับไบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรในการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับจุลธาตุสำหรับการผลิตอ้อยในอนาคตต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

ศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับไบรอนต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) พันธุ์ LK 92-11 ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองต่อเนื่องจากปริญญาพันธุ์ (2561) ณ แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่ง

เป็นชุดดินกำแพงแสน (Kamphaeng Saen soil series, Ks; Typic Haplustalfs; fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic) (Soil Survey Staff, 2003) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560-เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะห์สมบัติบางประการของดิน ได้แก่ ค่า pH (1:1) ค่าสภาพการนำไฟฟ้าของดินในสภาพอิ่มตัวด้วยน้ำ (ECe) ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ปริมาณไบรอนที่สกัดได้โดยสกัดดินด้วยสารละลาย 0.01 M CaCl_2 แล้วนำไปวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ตามวิธีของ Azomethine-H (Shanina et al., 1967; Gupta, 1993) และเนื้อดิน สำหรับสมบัติบางประการของดินก่อนการทดลองได้แสดงไว้ใน Table 1 งานทดลองนี้ประกอบด้วย 27 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 6.0 เมตร จำนวน 5 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยเฉพาะ 3 แถวกลาง เว้นหัวและท้ายแถวประมาณ 1 เมตร โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวในแต่ละแปลงย่อยเท่ากับ 4.5×4.0 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จำนวน 3 ซ้ำ 9 ดำรับทดลอง ดังนี้

ตำรับทดลอง	คำบรรยาย	สัญลักษณ์	ปริมาณธาตุอาหารหลัก (กก. N-P ₂ O ₅ -K ₂ O ต่อไร่)
T ₁	ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี	control	0-0-0
T ₂	ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	IF _{DOA_100%}	18-6-12
T ₃	ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่	IF _{DOA_100%} +B ₅₂	18-6-12
T ₄	ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่	IF _{DOA_100%} +B ₁₀₄	18-6-12
T ₅	ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่	IF _{DOA_100%} +B ₁₅₆	18-6-12
T ₆	ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน	IF _{DOA_110%}	19.8-6.6-13.2
T ₇	ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่	IF _{DOA_110%} +B ₅₂	19.8-6.6-13.2
T ₈	ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่	IF _{DOA_110%} +B ₁₀₄	19.8-6.6-13.2
T ₉	ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่	IF _{DOA_110%} +B ₁₅₆	19.8-6.6-13.2

การใส่ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21 %N) ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (42 %P₂O₅) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (60 %K₂O) แบ่งใส่ 2 ครั้งๆ ละครึ่งอัตราในแต่ละตำรับทดลอง ที่อายุ 2 และ 4 เดือน โดยตำรับทดลองที่ 2-5 ใส่อัตรา 18, 6 และ 12 กก.N, P₂O₅ และ K₂O ต่อไร่ ตามลำดับ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ส่วนตำรับทดลองที่ 6-9 ใส่อัตรา 19.8, 6.6 และ 13.2 กก.N, P₂O₅ และ K₂O ต่อไร่ ตามลำดับ (เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าวิเคราะห์ดิน) สำหรับการใส่ปุ๋ยโบรอน (B₂O₃) ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดสีขาว pH = 9.3 ความชื้น 0.53 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณโบรอนทั้งหมด 14.50 เปอร์เซ็นต์ แบ่งใส่ 2 ครั้งๆ ละครึ่งอัตราในแต่ละตำรับทดลอง (ผสมคลุกเคล้าและใส่รวมไปกับปุ๋ยเคมี) ที่อายุ 2 และ 4 เดือน โดยใส่อัตรา 52, 104 และ 156 กรัม/ไร่ ในตำรับทดลองที่ 3 กับ 7 ตำรับทดลองที่ 4 กับ 8 และตำรับทดลองที่ 5 กับ 9 ตามลำดับ

การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือน ได้แก่ ความสูงต้น จำนวนลำใน 1 แถวเมตร และค่าความเขียวของใบ (SPAD reading) (วัดตำแหน่งใบที่ 3-5 จากปลายยอด ทำการวัด 6 ครั้งต่อใบ) ซึ่งวัดโดยใช้เครื่อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD-502 model) ส่วนการเก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่อายุ 12 เดือน ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ จำนวนลำต่อไร่ ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำ น้ำหนักต่อลำ จำนวนปล้องต่อลำ ค่า CCS และผลผลิตน้ำตาล นอกจากนี้ วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในท่อนลำ ได้แก่ ความเข้มข้นธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามที่ได้อธิบายไว้โดยทัศนีย์ และจรงค์ (2542) และปริมาณโบรอนที่สกัดได้ โดยการย่อยสลายตัวอย่างพืชตามวิธี Azomethine-H จากนั้น นำไปวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร ตามที่ได้อธิบายไว้โดย ทัศนีย์และจรงค์ (2542)

Table 1 Chemical and physical properties of soil before the experiment.

Properties	Results (0-30 cm)	Rating
pH (1:1)	6.82	neutral
EC _e (dS/m)	2.20	non-saline
Organic matter (%) ^{1/}	1.68	moderately
Available P (mg/kg) ^{2/}	108.88	very high
Exchangeable K (mg/kg) ^{3/}	104.49	high
Exchangeable Ca (mg/kg) ^{3/}	2,365	high
Exchangeable Mg (mg/kg) ^{3/}	173.02	high
Exchangeable B (mg/kg)	1.12	moderately
Texture ^{4/}	sandy clay loam	-

Note ^{1/} = Walkley and Black method (Walkley and Black, 1934) ^{2/} = Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)

^{3/} = Extracted with NH₄OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)

^{4/} = Pipette method (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2558)

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับไบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน ปรางกุ ผลดังนี้

1. การเจริญเติบโตของอ้อยตอ (ปีที่ 1)

การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกับไบรอนอัตราต่างๆ มีผลให้ความสูงของต้นอ้อยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ ที่อายุ 3, 6 และ 9 เดือนพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้ความสูงของต้นอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) และ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$)

($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน ($IF_{DOA_110\%}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{52}$) ส่วนที่อายุ 8 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้ความสูงของต้นอ้อยมากที่สุด (318.56 ซม.) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$)

Table 2 Height of first ratoon cane at different stages.

Treatments	Height (cm)			
	3 Months	6 Months	8 Months	9 Months
T ₁ = control	87.89 ^{c 1/}	164.21 ^{c 1/}	215.92 ^{d 1/}	221.24 ^{c 1/}
T ₂ = IF _{DOA_100%}	118.25 ^b	212.49 ^b	267.54 ^c	279.90 ^b
T ₃ = IF _{DOA_100%} + B ₅₂	122.57 ^{ab}	216.86 ^{ab}	298.12 ^b	309.60 ^a
T ₄ = IF _{DOA_100%} + B ₁₀₄	127.16 ^{ab}	221.46 ^{ab}	301.11 ^b	311.20 ^a
T ₅ = IF _{DOA_100%} + B ₁₅₆	129.85 ^{ab}	222.81 ^{ab}	308.49 ^{ab}	316.73 ^a
T ₆ = IF _{DOA_110%}	124.61 ^{ab}	220.13 ^{ab}	299.80 ^b	310.49 ^a
T ₇ = IF _{DOA_110%} + B ₅₂	130.66 ^a	222.84 ^{ab}	313.02 ^a	321.24 ^a
T ₈ = IF _{DOA_110%} + B ₁₀₄	130.87 ^a	227.53 ^{ab}	313.12 ^a	329.54 ^a
T ₉ = IF _{DOA_110%} + B ₁₅₆	130.93 ^a	230.76 ^a	318.56 ^a	330.55 ^a
F-test	**	**	**	**
C.V. (%)	15.04	14.21	14.19	14.50

^{1/} means within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by DMRT

** indicated significant difference at P< 0.01

การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดี่ยว หรือใส่ร่วมกับ ไบรอนอัตราต่างๆ มีผลให้จำนวนลำใน 1 แถวเมตร ของอ้อยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 3) กล่าวคือ ที่ อายุ 3 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของ ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มีผลให้จำนวนลำใน 1 แถวเมตร ของอ้อยมากที่สุด (12.75 ลำ) ไม่แตกต่างกับการ ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ ไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) การใส่ ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ ไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₅₂) การใส่ ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_100%} + B₁₅₆) การใส่ปุ๋ยเคมีตาม ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_100%} + B₁₀₄) และการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน (IF_{DOA_110%}) อายุ 6 เดือน พบ ว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน

ร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มีผลให้จำนวนลำใน 1 แถวเมตรของอ้อยมากที่สุด (13.65 ลำ) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่ม ขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₅₂) และการใส่ปุ๋ยเคมีตาม ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ ไร่ (IF_{DOA_100%} + B₁₅₆) ที่อายุ 8 เดือน พบว่า การ ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วม กับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มี ผลให้จำนวนลำใน 1 แถวเมตรของอ้อยมากที่สุด (13.56 ลำ) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่ม ขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอน อัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) ส่วนที่อายุ 9 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของ ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มีผลให้จำนวนลำใน 1 แถวเมตร

ของอ้อยมากที่สุด (13.42 ลำ) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าจำนวนลำใน 1 แถวเมตรของอ้อยที่อายุ 8 และ 9 เดือน มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่ออ้อยมีการเจริญเติบโตในด้านความสูงเพิ่มขึ้น จึงมีผลให้เกิดการบังแสงทำให้แสงแดดที่ส่องผ่านเข้าไปในกออ้อยมีปริมาณลดลง ดังนั้น เมื่อหน่ออ้อยที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้รับแสงอย่างเหมาะสม ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงลดลง หรืออาจเป็นผลจากการแก่งแย่งธาตุอาหาร การสะสมของโรคและแมลง จึงทำให้นกอ้อยใหม่ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยสิทธิ์และปจรรย์ (2552) จุฑามาศ และคณะ (2553) นริรัตน์ และคณะ (2553) เยาวลักษณ์ และคณะ (2554) ปิยพงศ์ และคณะ (2555) วิษณุ และคณะ (2556) ปิยวรรณ และคณะ (2557) พชรกร และคณะ (2558) ชัยสิทธิ์ และคณะ (2560) นัฐพร และคณะ (2561) และกัญญาพัชญ์ และคณะ (2561)

การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกับโบรอนอัตราต่างๆ มีผลให้ค่าความเขียวของใบอ้อยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 4) กล่าวคือที่อายุ 3 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้ค่าความเขียวของใบอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน ($IF_{DOA_110\%}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{52}$) ที่อายุ 6 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้ค่าความเขียวของใบอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) ส่วนที่อายุ 8 และ 9 เดือน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้ค่าความเขียวของใบอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$) โดยมีข้อสังเกตว่าค่าความเขียวของใบอ้อยที่อายุ 8 และ 9 เดือน มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ทั้งนี้เนื่องจากชุดดินกำแพงแสนมีปริมาณอินทรีย์วัตถุในระดับปานกลาง ดังนั้น ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงตามระยะเวลา จึงส่งผลให้ค่าความเขียวของใบอ้อยลดลง ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์นั่นเอง (ยงยุทธ, 2558) อย่างไรก็ตาม ตำรับควบคุม (control) มีผลให้ความสูงของต้น จำนวนลำใน 1 แถวเมตร และค่าความเขียวของใบอ้อยน้อยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต

Table 3 Number of stalk within one-meter row of first ratoon cane at different stages.

Treatments	Number of stalk within one-meter row			
	3 Months	6 Months	8 Months	9 Months
T ₁ = control	9.23 ^{d 1/}	9.78 ^{d 1/}	9.58 ^{g 1/}	9.41 ^{e 1/}
T ₂ = IF _{DOA_100%}	11.11 ^c	11.74 ^c	11.62 ^f	11.52 ^d
T ₃ = IF _{DOA_100%} + B ₅₂	11.42 ^{bc}	12.21 ^c	12.14 ^e	12.00 ^c
T ₄ = IF _{DOA_100%} + B ₁₀₄	12.12 ^{abc}	12.58 ^{bc}	12.46 ^d	12.34 ^c
T ₅ = IF _{DOA_100%} + B ₁₅₆	12.36 ^{ab}	13.21 ^{ab}	13.14 ^c	13.03 ^b
T ₆ = IF _{DOA_110%}	11.84 ^{abc}	12.41 ^{bc}	12.34 ^{de}	12.26 ^c
T ₇ = IF _{DOA_110%} + B ₅₂	12.54 ^{ab}	13.34 ^{ab}	13.25 ^{bc}	13.14 ^{ab}
T ₈ = IF _{DOA_110%} + B ₁₀₄	12.67 ^a	13.58 ^a	13.47 ^{ab}	13.36 ^{ab}
T ₉ = IF _{DOA_110%} + B ₁₅₆	12.75 ^a	13.65 ^a	13.56 ^a	13.42 ^a
F-test	**	**	**	**
C.V. (%)	15.11	14.15	13.25	12.63

^{1/} means within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by DMRT

** indicated significant difference at P < 0.01

Table 4 Leaf greenness (SPAD reading) of first ratoon cane at different stages.

Treatments	SPAD reading			
	3 Months	6 Months	8 Months	9 Months
T ₁ = control	31.23 ^{c 1/}	30.84 ^{c 1/}	28.23 ^{e 1/}	27.55 ^{e 1/}
T ₂ = IF _{DOA_100%}	35.84 ^b	41.62 ^b	38.45 ^d	38.23 ^d
T ₃ = IF _{DOA_100%} + B ₅₂	36.04 ^{ab}	42.04 ^b	39.45 ^{cd}	38.45 ^d
T ₄ = IF _{DOA_100%} + B ₁₀₄	36.30 ^{ab}	42.17 ^b	40.12 ^{bcd}	39.87 ^{bc}
T ₅ = IF _{DOA_100%} + B ₁₅₆	36.35 ^{ab}	42.30 ^b	41.23 ^{abc}	40.23 ^{abc}
T ₆ = IF _{DOA_110%}	36.13 ^{ab}	42.16 ^b	39.88 ^{cd}	39.23 ^{cd}
T ₇ = IF _{DOA_110%} + B ₅₂	36.87 ^{ab}	43.21 ^{ab}	41.78 ^{ab}	40.89 ^{ab}
T ₈ = IF _{DOA_110%} + B ₁₀₄	38.15 ^{ab}	43.73 ^{ab}	42.05 ^a	41.00 ^a
T ₉ = IF _{DOA_110%} + B ₁₅₆	39.52 ^a	44.57 ^a	42.12 ^a	41.11 ^a
F-test	**	**	**	**
C.V. (%)	13.19	12.72	12.54	11.52

^{1/} means within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by DMRT

** indicated significant difference at P < 0.01

2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ต่อ (ปีที่ 1)

2.1 ผลผลิตและจำนวนลำต่อไร่

การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกับไบรอนอัตราต่างๆ มีผลให้ผลผลิตอ้อยสดและจำนวนลำต่อไร่ของอ้อยที่อายุ 12 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 5) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้ผลผลิตของอ้อยมากที่สุด (23.56 ตัน/ไร่) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$) นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{104}$) มีผลให้จำนวนลำต่อไร่ของอ้อยมากที่สุด (10,444 ลำ/ไร่) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน ($IF_{DOA_110\%}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$) ขณะที่ดำรับควบคุม (control) มีผลให้ผลผลิตอ้อยสดและจำนวนลำต่อไร่ของอ้อยต่ำที่สุด (10.32 ตัน/ไร่ และ 8,060 ลำ/ไร่ ตามลำดับ)

2.2 ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำ น้ำหนักต่อลำ และจำนวนปล้องต่อลำ

การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกับไบรอนอัตราต่างๆ มีผลให้ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำ น้ำหนักต่อลำ และจำนวนปล้องต่อลำของอ้อยที่อายุ 12 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 5 และ

Table 6) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้ความยาวลำของอ้อยมากที่สุด (321.58 ซม.) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) ยังมีผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยมากที่สุด (3.31 ซม.) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{156}$) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_100\%} + B_{104}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน ($IF_{DOA_110\%}$) ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{156}$) มีผลให้น้ำหนักต่อลำและจำนวนปล้องต่อลำของอ้อยมากที่สุด (2.41 กก./ลำ และ 32.57 ปล้อง/ลำ ตามลำดับ) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{104}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_110\%} + B_{52}$) ขณะที่ดำรับควบคุม (control) มีผลให้ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำ น้ำหนักต่อลำ และจำนวนปล้องต่อลำของอ้อยน้อยที่สุด (257.47 ซม., 2.47 ซม., 1.28 กก./ลำ และ 23.42 ปล้อง/ลำ ตามลำดับ)

Table 5 Yields, number of stalk/rai, stalk height and stalk diameter of first ratoon cane at 12 months

Treatments	Yield (ton/rai)	Number of stalk (stalk/rai)	Stalk height (cm)	Stalk diameter (cm)
T ₁ = control	10.32 ^{e 1/}	8,060 ^{d 1/}	257.47 ^{f 1/}	2.47 ^{d 1/}
T ₂ = IF _{DOA_100%}	17.55 ^d	9,645 ^c	300.46 ^e	3.10 ^c
T ₃ = IF _{DOA_100%} + B ₅₂	18.72 ^{cd}	10,012 ^{bc}	302.57 ^{de}	3.12 ^{bc}
T ₄ = IF _{DOA_100%} + B ₁₀₄	20.56 ^{bc}	10,444 ^a	305.48 ^{de}	3.21 ^{abc}
T ₅ = IF _{DOA_100%} + B ₁₅₆	21.85 ^{ab}	10,027 ^{abc}	308.77 ^{cd}	3.25 ^{ab}
T ₆ = IF _{DOA_110%}	19.53 ^{cd}	10,173 ^{ab}	305.16 ^{de}	3.18 ^{abc}
T ₇ = IF _{DOA_110%} + B ₅₂	22.63 ^a	10,063 ^{abc}	311.62 ^{bc}	3.27 ^a
T ₈ = IF _{DOA_110%} + B ₁₀₄	23.24 ^a	9,895 ^{bc}	315.55 ^b	3.28 ^a
T ₉ = IF _{DOA_110%} + B ₁₅₆	23.56 ^a	9,784 ^{bc}	321.58 ^a	3.31 ^a
F-test	**	**	**	**
C.V. (%)	15.69	13.22	12.15	12.29

^{1/} means within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by DMRT

** indicated significant difference at P< 0.01

2.3 ค่า commercial cane sugar (CCS) และผลผลิตน้ำตาล

การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดี่ยว หรือใส่ร่วมกับโบรอนอัตราต่างๆ มีผลให้ค่า CCS และผลผลิตน้ำตาลของอ้อยที่อายุ 12 เดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มีผลให้ค่า CCS ของอ้อยมากที่สุด (11.43 เปอร์เซ็นต์) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 52 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₅₂) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_100%} + B₁₅₆) ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 %

ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มีผลให้ผลผลิตน้ำตาลของอ้อยมากที่สุด (2.69 ตัน/ไร่) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) ขณะที่ดำรับควบคุม (control) มีผลให้ค่า CCS และผลผลิตน้ำตาลของอ้อยน้อยที่สุด (8.34 เปอร์เซ็นต์ และ 0.86 ตัน/ไร่ ตามลำดับ)

Table 6 Weight/stalk, number of internode/stalk, CCS and sugar yield of first ratoon cane at 12 months.

Treatments	Weight/stalk (kg)	Number of internode/stalk	CCS (%)	Sugar yield (ton/rai)
T ₁ = control	1.28 ^{d1/}	23.42 ^{c1/}	8.34 ^{e1/}	0.86 ^{g1/}
T ₂ = IF _{DOA_100%}	1.82 ^c	29.56 ^b	9.95 ^d	1.75 ^f
T ₃ = IF _{DOA_100%} + B ₅₂	1.87 ^c	29.72 ^b	10.22 ^{cd}	1.91 ^e
T ₄ = IF _{DOA_100%} + B ₁₀₄	1.97 ^c	30.14 ^b	10.53 ^{bcd}	2.16 ^d
T ₅ = IF _{DOA_100%} + B ₁₅₆	2.18 ^b	30.28 ^b	10.89 ^{abc}	2.38 ^c
T ₆ = IF _{DOA_110%}	1.92 ^c	30.11 ^b	10.31 ^{cd}	2.01 ^e
T ₇ = IF _{DOA_110%} + B ₅₂	2.25 ^{ab}	31.59 ^{ab}	11.15 ^{ab}	2.52 ^b
T ₈ = IF _{DOA_110%} + B ₁₀₄	2.35 ^a	32.41 ^a	11.27 ^a	2.62 ^{ab}
T ₉ = IF _{DOA_110%} + B ₁₅₆	2.41 ^a	32.57 ^a	11.43 ^a	2.69 ^a
F-test	**	**	**	**
C.V. (%)	13.54	13.63	13.74	13.44

^{1/} means within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by DMRT

** indicated significant difference at P< 0.01

2.4 ความเข้มข้นของธาตุอาหารที่ สะสมในท่อน้ำของอ้อย

การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกับ
ไบรอนอัตราต่างๆ มีผลให้ความเข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และไบรอน
ที่สะสมในท่อน้ำของอ้อยที่อายุ 12 เดือน แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 7)
กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่
(IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มีผลให้ความเข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่สะสมในท่อน้ำของ
อ้อยมากที่สุด (0.253 และ 0.461 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ลำดับ) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 %
ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 104 กรัม/
ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) และการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10
% ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา 52 กรัม/
ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₅₂) นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่ม
ขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา
156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆) มีผลให้ความเข้มข้น

ของธาตุฟอสฟอรัสที่สะสมในท่อน้ำของอ้อย
มากที่สุด (0.084 เปอร์เซ็นต์) ไม่แตกต่างกับการ
ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วม
กับไบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) ส่วน
การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับไบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₅₆)
มีผลให้ความเข้มข้นของธาตุไบรอนที่สะสมในท่อน
น้ำของอ้อยมากที่สุด (8.15 มก./กก.) รองลงมา คือ
การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอน
อัตรา 156 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_100%} + B₁₅₆) การใส่ปุ๋ยเคมี
เพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอน
อัตรา 104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_110%} + B₁₀₄) และการใส่
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับไบรอนอัตรา
104 กรัม/ไร่ (IF_{DOA_100%} + B₁₀₄) ตามลำดับ ขณะที่
ที่ดำรับควบคุม (control) มีผลให้ความเข้มข้น
ของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
ไบรอนที่สะสมในท่อน้ำของอ้อยน้อยที่สุด (0.081
เปอร์เซ็นต์, 0.036 เปอร์เซ็นต์, 0.352 เปอร์เซ็นต์
และ 1.42 มก./กก. ตามลำดับ)

Table 7 Concentrations of major plant nutrients and B in stalk of first ratoon cane at 12 months.

Treatments	Total N (%)	Total P (%)	Total K (%)	Extractable B (mg/kg)
T ₁ = control	0.081 ^{d 1/}	0.036 ^{e 1/}	0.352 ^{d 1/}	1.42 ^{h 1/}
T ₂ = IF _{DOA_100%}	0.214 ^c	0.058 ^d	0.427 ^c	2.92 ^a
T ₃ = IF _{DOA_100%} + B ₅₂	0.218 ^c	0.060 ^d	0.431 ^c	4.29 ^e
T ₄ = IF _{DOA_100%} + B ₁₀₄	0.225 ^{bc}	0.063 ^d	0.435 ^c	5.72 ^d
T ₅ = IF _{DOA_100%} + B ₁₅₆	0.232 ^b	0.069 ^c	0.436 ^c	7.23 ^b
T ₆ = IF _{DOA_110%}	0.237 ^b	0.076 ^b	0.448 ^b	3.15 ^f
T ₇ = IF _{DOA_110%} + B ₅₂	0.243 ^{ab}	0.078 ^b	0.453 ^{ab}	4.38 ^e
T ₈ = IF _{DOA_110%} + B ₁₀₄	0.247 ^a	0.080 ^{ab}	0.457 ^{ab}	6.38 ^c
T ₉ = IF _{DOA_110%} + B ₁₅₆	0.253 ^a	0.084 ^a	0.461 ^a	8.15 ^a
F-test	**	**	**	**
C.V. (%)	12.88	12.39	11.59	12.01

^{1/} means within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference by DMRT

** indicated significant difference at P < 0.01

จากผลการทดลองทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ให้ข้อสังเกตว่าการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับโบรอนมีแนวโน้มให้การเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต รวมทั้งความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สะสมในท่อน้ำของอ้อยดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ การใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (control) มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต รวมทั้งความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สะสมในท่อน้ำของอ้อยต่ำที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการปลูกพืชที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยในระยะยาวจะมีผลให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดน้อยลง และไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และการสร้างผลผลิตของพืช (ชัยสิทธิ์และปาจริย์, 2552; จุฑามาศ และคณะ, 2553; นริรัตน์ และคณะ, 2553; เยาวลักษณ์ และคณะ, 2554; ปิยพงศ์ และคณะ, 2555; วิษณุ และคณะ, 2556; ปิยวรรณ และคณะ, 2557; พชรกร และคณะ, 2558; ชัยสิทธิ์ และคณะ, 2560; นัฐพร และคณะ, 2561) นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าค่ารับทดลองที่มีการ

ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ ทั้งที่ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับโบรอนในอัตราที่สูงขึ้น (ค่ารับทดลองที่ 6-9) มีผลให้การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในท่อน้ำของอ้อย โดยภาพรวมสูงกว่าค่ารับทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ ทั้งที่ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับโบรอนในอัตราที่ต่ำกว่า (ค่ารับทดลองที่ 2-5) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานทดลองของภิญญาพัชญ์ และคณะ (2561)

สรุป

การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ มีผลให้ความสูงของต้น จำนวนลำใน 1 แถวเมตร ค่าความเขียวของใบอ้อย ผลผลิตอ้อยสด น้ำหนักต่อลำ จำนวนปล้องต่อลำ ค่า CCS ผลผลิตน้ำตาล ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่สะสมในท่อน้ำของอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่

นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ยังให้ผลให้ความเข้มข้นของธาตุโบรอนที่สะสมในท่อนลำของอ้อยมากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_{100\%}} + B_{156}$) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_{110\%}} + B_{104}$) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ ($IF_{DOA_{100\%}} + B_{104}$) ตามลำดับ การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะนำปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับโบรอนสำหรับการปลูกอ้อย ซึ่งส่งผลให้การเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อยโดยภาพรวมค่อนข้างดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินในช่วงที่ทำการศึกษาด้วย

คำขอบคุณ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัย ระหว่างภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งบริษัท วาย.วี.พี เพอร์ติไลเซอร์ จำกัด ที่สนับสนุนปุ๋ยเคมีตลอดระยะเวลาวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร. 2553. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2558. คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางดิน ระบบไฮโดรทศานุปรกรณ์. คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

จุฑามาศ กล่อมจิตร์, ชัยสิทธิ์ ทองจุ และจุฑามาศ ร่มแก้ว. 2553. ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยต่อปีที่ 1 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน, น. 148-159. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.

ชัยสิทธิ์ ทองจุ และปาจรีย์ เน้นหนา. 2552. ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน (ปีที่ 1). วารสารดินและปุ๋ย 31(1) : 6-26.

ชัยสิทธิ์ ทองจุ, ปิยะพงศ์ เขตปิยรัตน์, ศุภชัย อำคา และธวัชชัย อินทร์บุญช่วย. 2560. ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้ของโรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตอ้อยและสมบัติของดิน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6(1) : 21-32.

ทัศนีย์ อัดตะนันท์ และจรงค์ษ์ จันท์เจริญสุข. 2542. แบบฝึกหัดและคู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

นริรัตน์ ชูช่วย, ชัยสิทธิ์ ทองจุ และศุภชัย อำคา. 2553. ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน, น. 21-32. ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.

- นัฐพร กลิ่นหอม, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, ทศพล พรพรม และรัชชัย อินทร์บุญช่วย. 2561. ผลของการจัดการปุ๋ยธาตุอาหารหลักรวมกับสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย. วารสารแก่นเกษตร 46(4): 709-720.
- ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, ศุภชัย อำคา และชาลินี คงสุด. 2555. ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมซีเฝ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย, น. 1209-1221. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
- ปิยวรรณ พุ่มพวง, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, ธงชัย มาลา, ศุภชัย อำคา, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ชาลินี คงสุด, ธีรยุทธ คล้าชื่น, ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ และศิริสุดา บุตรเพชร. 2557. ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย, 11-23 น. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
- พชรกร บุญเลี้ยง, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, ทศพล พรพรม, รัชชัย อินทร์บุญช่วย, ชาลินี คงสุด, ธีรยุทธ คล้าชื่น, ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ธนศมณฑ์ กุลการณย์เลิศ, อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ, รุจิกร ศรีมั่นม่วง และศิริสุดา บุตรเพชร. 2558. ผลของปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้าที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยต่อปีที่ 1, 609-619 น. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
- ภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร. 2561. ผลของการจัดการปุ๋ยร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, จุฑามาศ ร่มแก้ว, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ และรัชชัย อินทร์บุญช่วย. 2561. ผลของการจัดการปุ๋ยร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7(1): 1-14.
- ยงยุทธ ไสยธสภ. 2558. ธาตุอาหารพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ยงยุทธ ไสยธสภ, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต สงประยูร. 2551. ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ยุคเลศร์ ชุ่นใจ. 2559. สถิติปริมาณปุ๋ยเคมีนำเข้า. วารสารดินและปุ๋ย 38(1-4) : 84.
- เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์, ชัยสิทธิ์ ทองจุ และรัฐชา ชัยชนะ. 2554. การใช้ประโยชน์ของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน. วิทยาสารกำแพงแสน 9(3): 1-13.
- ระวีวรรณ โชติพันธ์, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, กุณฑล สังขศิลา, จุฑามาศ ร่มแก้ว และสุรเดช จินตกานนท์. 2552. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดงปลายฤดูฝน, น. 60-71. ในการประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

- วิชญ์ จินยัว, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, ศุภชัย อำคา, ทศพล พรพรหม และ ศิริสุดา บุตรเพชร. 2556. การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย, น. 86-99. ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
- ศิริสุดา บุตรเพชร, ชัยสิทธิ์ ทองจุ, กุมุท สังขศิลา, จุฑามาศ ร่มแก้ว และสุรเดช จินตกานนท์. 2552. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสนปลายฤดูฝน, น. 51-62. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, นครปฐม.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2556-2558. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
- Bray, R.H. and N. Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. *Soil Sci.* 59: 39-45.
- Gupta, U.C. 1993. Boron, Molybdenum and Selenium. In *Soil Sampling and Methods of Analysis*, Carter, M.R. ed. Lewis Publishers. London.
- Miller, R.W. and R.L. Donahue. 1995. *Soils in Our Environment*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. pp. 302-316.
- Plaster, E.J. 1992. *Soil Science and Management*. New York, Delmar Publishers. Inc. 514 p.
- Pratt, P.F. 1965. Potassium. p. 1022-1030. In C.A. Black, ed. *Methods of Soil Analysis*. Part II. Amer. Soc. of Agron, Inc. Madison, Wisconsin.
- Shanina, T.M., Gelman, N.E. and V.S. Mikhailovskaya. 1967. Quantitative analysis of heteroorganic compounds, Spectrophotometric microdetermination of boron. *J. Anal. Chem. USSR*. 22: 782-787.
- Soil Survey Staff. 2003. *Key to Soil Taxonomy: Ninth Edition*. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Washington, D.C. 332 p.
- Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chronic acid titration method. *Soil Sci.* 37: 29-38.